Bijlage 4: Beheerdoelen en beheermaatregelen



Beheermaatregelen

Hieronder volgt per beheertype een samenvatting van de maatregelen gedurende het omvormings- en eindbeheer.

Water

Zandwinplas en strangen
Op een jaarlijkse inspectie na, zijn in het eindbeheer voor de zandwinplas en de strangen geen reguliere beheermaatregelen van toepassing. De oevers van de zandwinplas worden beheerd binnen de beheertypen slikkige rivieroevers en ooibos. De oevers van de strangen worden beheerd via het type rietmoeras.

Slikkige rivieroevers
De pionierssituatie van slikkige rivieroevers wordt in stand gehouden door de natuurlijke fluctuaties in het waterpeil. In aanvulling hierop bestaat het eindbeheer uit:

- Jaarlijks één derde maaien (maaihoogte circa tien centimeter) in september – oktober om ongewenste opslag en andere ongewenste vegetaties te voorkomen.

Als omvormingsbeheer is een intensievere controle van ongewenste opslag noodzakelijk.

Kleine waterelementen
Kleine waterelementen hebben een intensiever beheer nodig dan de grotere strangen, dit om voornamelijk verlanding tegen te gaan. In het eindbeheer bestaat dit uit:

- Iedere twee jaar een derde deel van de oevervegetatie maaien met een bosmaaier.
- Aanvullend worden langs het hele element iedere twee jaar van ongewenste opslag en
- andere ongewenste vegetaties verwijderd;
- Cyclisch beheer van eens per 10 jaar baggeren.

Bij nieuwe poelen is het van belang deze tijdens het omvormingsbeheer extra te controleren op ongewenste opslag en andere vegetatie en deze indien nodig te verwijderen.

Grasland

Hooiland
De hooilanden worden als één geheel beheerd door middel van een extensief maaibeheer met nabeweiding. Het eindbeheer bestaat uit:

- Één maal per jaar (juli) maaien, afhankelijk van vegetatieve ontwikkelingen en broedseizoen van de beoogde soorten. Hierbij is het van belang niet alles in eens te maaien, waardoor fauna de kans krijgt te vluchten.
- Op plaatsen waar beschermde broedvogelsoorten zich gevestigd hebben word het maaibeheer uitgesteld tot september.

Als omvormingsbeheer is een intensiever en eventueel selectief maaibeheer noodzakelijk om ongewenste opslag te voorkomen noodzakelijk.

Wintergastenweide
Het beheer van wintergastenweide word verzorgd door locale agrarische bedrijven en bestaat uit het reguliere agrarische beheer van productiegrasland. Er worden voor dit beheertype geen specifieke beheermaatregelen voorgeschreven.

Biologische akker
Het beheer van kruiden en faunarijke akkers zal volledig worden verzorgd door een externe partij. Het beheer wordt gestuurd door de uitgangspunten van de biologische landbouw. Op een jaarlijkse inspectie na worden er geen beheermaatregelen voorgeschreven.

- Regelmatig maaien en afvoeren van de bermen, voor zover deze door de overheden beheerd worden. De maaifrequentie wordt bepaald door de groei van de vegetatie;
- Regelmatig legen van afvalbakken. Frequentie afhankelijk van het seizoen;
- Eens per 20 à 30 jaar groot onderhoud.

Beheermaatregelen in de tijd
Bovenstaande gegevens zijn samengevat in onderstaande tabel. Daarin is een globale opzet

van de werkzaamheden in de tijd weergegeven.

Tabel: Globale opzet werkzaamheden beheermaatregelen

Beheertype	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Water												
Zandwinplas en strangen					Ji							
Slikkige rivieroevers					Ji				Mb	Mb		
Kleine waterelementen					Ji	Mb			Os	Os		
Grasland												
Hooiland					Ji		Mb	Nb	Nb	Nb		
Wintergasten-weide	B3	B3	B3	B3	B3/Ji	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
Biologische akker	B3	B3	B3	B3	B3/Ji	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
Bos en opgaande beplantingen												
Ooibos					Ji							
Struwelen					Ji					Sb	Sb	
Ruigte					Ji		Mb	(eens per 3 jaar)				
Rietmoeras					Ji							
Overig												
Huidig beheer	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
Recreatieve en technische elementen				Mb	Ji		Mb		Mb			

Legenda

Ji	Jaarlijkse inspectie
Os	Opschonen wateren
Mb	Maaibeheer
Nb	Nabeweiding
Sb	Struweel beheer: eens per 5 jaar circa een kwart afzetten
B3	Beheer door derden